

A monitor rendszerben 2006 évben invazív mintákból jelentett coagulase-negatív staphylococcus törzsek antibiotikum érzékenysége

| Antibiotikum | Penicillin | Oxacillin | Ciprofloxacín | Gentamicin | Amikacin | Erythromycin | Clindamycin | Vancomycin | Teicoplanin | Rifampicin | Tetracyclin | Quinupristin\ dalphopristin | Linezolid | Sumetrolim |
|----------------|------------|-----------|---------------|------------|----------|--------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--------------------------------|-----------|------------|
| Érzékeny (%) | 8,1 | 43,2 | 56,4 | 64,9 | 77,8 | 33,8 | 45,6 | 100,0 | 100,0 | 94,1 | 64,9 | 100,0 | 92,5 | 45,5 |
| Mérsékelt (%) | 0,0 | 0,1 | 4,7 | 1,8 | 1,3 | 0,2 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 2,1 |
| Rezisztens (%) | 91,9 | 56,7 | 38,9 | 33,3 | 20,9 | 66,0 | 53,8 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 33,9 | 0,0 | 7,5 | 52,4 |
| Törzs (beteg) | 4705 | 4962 | 3445 | 4607 | 2511 | 4922 | 4878 | 4902 | 2191 | 968 | 2042 | 6 | 67 | 3717 |