

**A monitor rendszerben 2019. évben vizelet mintákból jelentett *Acinetobacter* spp. izolátumok antibiotikum érzékenysége**

Antibiotikum	Imipenem	Meropenem	Ciprofloxacín	Levofloxacín	Gentamicin	Tobramycín	Amikacin	Sumetrolim
<b><i>Acinetobacter baumannii</i></b>								
Érzékeny (%)	43,9	38,1	-	27,0	38,6	61,4	47,4	33,0
Maximális dóziszra érzékeny (%)	2,5	4,0	20,2	0,0	0,0	-	-	0,0
Rezisztens (%)	53,6	57,9	79,8	73,0	61,4	38,6	52,6	67,0
Törzs (beteg)	314	323	311	230	324	298	285	230
<b><i>Egyéb Acinetobacter baumannii/calcoaceticus</i> complex-be tartozó specíesek (<i>A. pittii</i>, <i>A. nosocomialis</i>, <i>A. calcoaceticus</i>)</b>								
Érzékeny (%)	98,1	94,5	-	91,7	96,4	98,1	98,1	80,8
Maximális dóziszra érzékeny (%)	0,0	0,0	66,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Rezisztens (%)	1,9	5,5	34,0	8,3	3,6	1,9	1,9	19,2
Törzs (beteg)	54	55	53	36	56	53	53	52
<b><i>Acinetobacter egyéb</i></b>								
Érzékeny (%)	97,6	95,4	-	88,9	94,0	92,8	95,5	90,1
Maximális dóziszra érzékeny (%)	0,0	1,4	73,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rezisztens (%)	2,4	3,2	26,7	11,1	6,0	7,2	4,5	9,9
Törzs (beteg)	209	217	184	162	218	209	179	192